



[Sobre Evidentia](#)

[Equipo de redacción](#)

[Instrucciones a los autores](#)

[Boletín de Suscripción](#)

Números publicados

Búsqueda documentos

Pre-edición Evidentia

Usted está consultando una edición de este artículo que no es definitiva

Pregunta Clínica

Práctica diaria



Lactantes y urgencias hospitalarias: ¿cateterismo vesical o bolsa recolectora para cultivo de orina y sedimento?

Evidentia 2007 nov-dic; 4(18)

Manuscrito aceptado el 06.09.07

[Documentos relacionados](#)

M^a Nieves Camacho Sánchez¹.

¹Enfermera clínica. E.P. Hospital de Poniente de Almería, España.

Cómo citar este documento: Camacho Sánchez MN. Lactantes y urgencias hospitalarias: ¿cateterismo vesical o bolsa recolectora para cultivo de orina y sedimento?. Evidentia. 2007 nov-dic; 4(18). En: <http://www.index-f.com/evidentia/n18/406articulo.php> [ISSN: 1697-638X]. Consultado el 13 de Septiembre de 2007

Descripción del problema clínico

Sistemáticamente a los niños lactantes valorados por los pediatras en urgencias por fiebre sin foco claro, se les prescribe analítica completa con sedimento de orina y urocultivo con la indicación de recogida de muestra mediante sondaje vesical. Se justifica esta práctica clínica bajo el criterio de que se garantiza la esterilidad de la muestra, asignándole más fiabilidad que a las muestras recogidas mediante bolsas recolectoras.

Mi planteamiento personal se basa en si verdaderamente es necesaria esta técnica tan invasiva para poder obtener un resultado fiable de la analítica de orina en los lactantes.



Preguntas susceptibles de respuesta

En esta situación: ¿Es necesario recoger la muestra de orina sistemáticamente mediante sondaje vesical a los lactantes? ¿Se pueden considerar igualmente fiables los resultados obtenidos mediante bolsa recolectora, tras limpieza adecuada de la zona? ¿Se justifica la eficacia de esta técnica frente al riesgo de infección que conlleva?



Análisis de la pregunta con sus componentes

Paciente: Lactantes con fiebre con petición de analítica de orina (sedimento y urocultivo)

Problema: Extracción de muestra de orina mediante sondaje urinario.

Intervención habitual: Recogida de muestra de orina por sistema en lactantes con fiebre mediante sondaje urinario

Intervención con la que comparar: Recogida de muestra con bolsa recolectora tras realizar limpieza adecuada de la zona.

Variables clínicas a considerar o variables relevantes que te ayudarán a decidir cuál es la mejor intervención:

-Bienestar de los lactantes

-Fiabilidad de los resultados analíticos

